

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-6-79131423

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : ~~XXXX~~

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE-D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

60 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 160 - 12 Juin 1979

V I G N E

SOINS CULTURAUX APRES UNE CHUTE DE GRELE :

- Si les dégâts sont limités, ne pas toucher aux rameaux porteurs, mais tailler très court tous les autres quand ils sont fortement mutilés.
- Si la récolte est entièrement perdue, il vaut mieux tout retailler tant que le mois de juin n'est pas dépassé. Les rameaux sont à rabattre pour favoriser le départ des contre-bourgeons qui donneront de nouvelles pousses.

Apporter ensuite tous les soins cultureux et la protection sanitaire à la nouvelle végétation.

MILDIOU - OIDIUM : Les premières taches apparues le 5 juin (à ROMANECHE -71-), le 6 juin (LE VERNIS -39-), le 7 juin (MILLY -89-), le 9 juin (SALINS -39-) sont peu nombreuses. Le dernier traitement conseillé à partir du 5 juin n'est donc à renouveler (sauf orages locaux entraînant un lessivage) qu'au début de la semaine prochaine.

TORDEUSES DE LA GRAPPE : Le premier vol se termine. Les observations effectuées dans différents postes de piégeage ayant révélé de très faibles pontes et éclosions, la lutte contre la première génération n'est à envisager que dans quelques situations régulièrement sensibles aux vers de la grappe.

En présence de dégâts au début floraison (3 toiles au moins pour 10 grappes) des insecticides à action rapide comme le parathion (nombreuses spécialités), le méthomyl (Lannate), le mévinphos (Phosdrin),... sont conseillés.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES : La protection à l'aide d'insecticides classiques n'est pas encore à envisager sauf en cas d'utilisation du diflubenzuron (Dimilin) pour lequel l'application doit être faite dès réception de cette note, des pontes nombreuses ayant été déposées en fin de semaine.

BLE D'HIVER :

CÉRÉALES

SEPTORIOSES : Les pluies orageuses des dernières semaines ont certainement favorisé la progression de cette maladie. En effet, les observations effectuées du 4 au 10 juin montrent qu'une parcelle sur trois présentent des symptômes sur les trois dernières feuilles, c'est-à-dire le niveau pour la préconisation d'un traitement. L'intervention devra se faire entre le début de l'épiaison et la fin de la floraison.

Les produits commerciaux actuellement homologués pour la septoriose sont : Milcap (4 l.), Céréal liquide (2 l.), Bavistine M (5 Kg), Grex TX (3 Kg), Epidor P (3,75 Kg), Silodor 80 (12,5 Kg), Saprol M (2 Kg + 1,5 l.), Peltar M (5 Kg).

Ces produits présentent une certaine efficacité contre la FUSARIOSE.

797

ROUILLE JAUNE : A ce jour aucun cas de rouille jaune n'est signalé dans la Circonscription.

PUCERONS : Compte tenu des observations actuelles (pucerons le plus souvent isolés), nous déconseillons l'emploi d'un insecticide.

CECIDOMYIES : Quelques vols sont signalés dans la NIEVRE (Bourgogne Nivernaise). Le traitement n'est pas toujours justifié. En cas de nécessité, le faire dans les 24 heures après l'observation si :

- la quantité de ravageurs est importante (observation du vol en fin de soirée)
- la céréale est au stade sensible (début épiaison à fin floraison)
- les conditions climatiques sont favorables à la ponte (soirées humides, chaudes et calmes).

CNEPHASIA, LEMA, AGROMYZA : Les traitements sont injustifiés.

ORGE DE PRINTEMPS :

Parallèlement au développement de la RHYNCHOSPORIOSE nous observons des attaques d'oïdium . Bien surveiller ces cultures et ne pas trop attendre en cas d'intervention.

BETTERAVES

Bien surveiller les PUCERONS noirs et verts. Se reporter au bulletin n° 159 du 5 juin 1979.

POMME DE TERRE

MILDIOU : Une première couverture fongicide est recommandée pour les cultures hâtives au stade floraison.

DORYPHORE : Des larves de doryphores étant observées dans les cultures depuis quelques jours, il est rappelé que la lutte contre ce ravageur ne doit pas être négligée. Une application insecticide est nécessaire lorsque les larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

CULTURES LÉGUMIÈRES

SEPTORIOSE DU CELERI : Assurer la protection fongicide des plants repiqués.

CRIOCERES DES ASPERGES : Dès l'apparition des larves ou des premiers adultes, intervenir rapidement par des pulvérisations ou poudrages de lindane.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de Circonscription adjoint :

G. RIFFIOD